

## Manometría antroduodenal

Este examen mide la presión o las contracciones en el estómago y el intestino delgado para determinar qué tan bien funcionan juntos el estómago y el duodeno.

### LA PREPARACIÓN DE SU HIJO

- Su hijo no deberá ingerir alimentos sólidos las ocho horas previas a la prueba. Puede beber líquidos claros hasta cuatro horas antes de la prueba. No deberá comer ni beber nada cuatro horas antes de la prueba. Se considera líquidos claros al Gatorade, paletas heladas, jugo de manzana, ginger-ale, agua azucarada y agua (no los productos de color rojo).
- Es posible que se le pida suspender algunos medicamentos 72 horas antes de la prueba.
- Usted permanecerá con el/ella durante toda la prueba.
- Explíquelo a su hijo cómo se realiza la prueba (la enfermera lo ayudará a hacerlo antes de la prueba. Puede ser útil que su hijo traiga su juguete favorito para que se sienta más cómodo durante el procedimiento).
- La prueba toma entre 6 y 8 horas.

### DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA

- Se iniciará la colocación de una vía intravenosa (IV).
- Se llevará a su hijo a la sala de procedimientos gastrointestinales.
- El anestesiólogo administrará medicamentos para ayudar a que su hijo se duerma cuando se introduce el catéter.
- Durante el procedimiento de la endoscopia superior (EGD), el médico utilizará la cámara para colocar un catéter estrecho a través de la nariz hasta el estómago y el intestino delgado. (Para los pacientes con tubos de gastrostomía/gastrostomía y yeyunostomía, el tubo se colocará a través de la abertura existente del tubo de gastrostomía).
- El tubo se asegurará con cinta adhesiva.
- Una vez que se coloque el catéter, se llevará a su hijo a la sala de recuperación (PACU).
- Una vez que su hijo despierte, se le trasladará a la sala de motilidad gastrointestinal (2 personas pueden acompañarlo).
- El catéter se conectará al equipo de manometría y a la computadora.
- En primer lugar, la prueba determinará cómo funciona el estómago/intestinos en reposo (en ayuno) de su hijo.
- Como parte de la prueba, su hijo recibirá alimentos y medicamentos. No permita que su hijo coma ni beba nada hasta que el personal se lo indique.

### DURANTE LA PRUEBA

- Su hijo puede tener náuseas con el tubo en la nariz y la garganta.
- Se le pedirá a su hijo que se recueste y permanezca lo más quieto posible.
- La prueba consiste en aplicar agua en el estómago y el intestino delgado; es posible que su hijo deba ir al baño con más frecuencia de lo habitual.
- Esta prueba no causa dolor, pero puede incomodar al niño; trabajaremos para que esté lo más cómodo posible.

### DESPUÉS DE LA PRUEBA

- Su hijo puede volver a una dieta normal, jugar y realizar las actividades habituales una vez que se complete la prueba y se extraiga el tubo de la nariz.
- El médico revisará los resultados de la prueba con usted.