

Prueba de impedancia pH

Este estudio mide el reflujo del contenido estomacal que va al esófago (tubo digestivo).

LA PREPARACION

- Su niño debe evitar tomar antiácidos o medicamentos que afecten la motilidad del estómago por 5 días antes del examen, a no ser que se le instruya de otra forma.
- Antes de la prueba no debe comer por 8 horas, ni beber por 6 horas.
- Puede tomar otros medicamentos normalmente programados con un sorbito de agua.

DESCRIPCION DEL EXAMEN

- El médico insertará un alambre con sensores (sonda de impedancia pH) en la nariz del niño yendo hacia el esófago y lo sujetará con cinta adhesiva en la mejilla.
- Este procedimiento puede hacerse en la habitación o en el quirófano bajo anestesia con otros procedimientos, si fueran necesarios.
- Obtendremos una radiografía del tórax para confirmar la posición de la sonda de impedancia pH. Basándose en la radiografía, se pueden hacer pequeños movimientos con la sonda.
- El estudio se hará por 23 horas por lo menos.

DURANTE LA PRUEBA

- Su niño puede sentir incomodidad con el catéter en la nariz que está sujetado en la mejilla.
- Usted debe escribir los síntomas en el diario y presionar el botón "síntoma" en el aparato de grabación. Esto es MUY IMPORTANTE. Los síntomas como tos, irritabilidad, arqueamiento, vómito, carraspera de la garganta y acidez estomacal deben escribirse específicamente. Los síntomas que no se estén investigando, por ej. dolor de pierna, no tiene que escribirlos ni apretar el botón.
- Las horas de las comidas y de acostarse deben registrarse en el diario a la hora que empezaron y a la hora que terminaron y debe presionar el botón.
- Evitar los alimentos ácidos, bebidas gaseosas, bebidas calientes o frías y comida durante el examen. No masticar chicle ni comer dulces duros.
- Este examen no causa dolor pero su hijo puede tener malestar. Lo ayudaremos a que sienta lo más cómodo posible.

DESPUES DEL ESTUDIO

- En casa puede quitarle la cinta adhesiva de la mejilla así como la sonda de impedancia pH de la nariz o pueden regresar a la unidad preoperatoria y una enfermera se los retirará.
- La grabadora, la sonda y el diario pueden entregarse en Choc como se instruyó.
- Su médico hablará con usted sobre los resultados de la prueba.